

医薬品を正しく購入するための 説 明 文 書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	<small>けいめい が しんさん</small> 恵命我神散 / <small>けいめい が しんさんえす</small> 恵命我神散S / <small>けいめい が しんさんえす さいりゅう</small> 恵命我神散S〈細粒〉																							
2	成分・分量	1回量(3g)中(恵命我神散)、1包(3g)中(恵命我神散S、恵命我神散S〈細粒〉) 莪朮(ガジュツ)末 2500mg、真昆布末 100mg																							
3	用法・用量	<p>次の量を水又は白湯で服用してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">年齢区分</th> <th style="text-align: center;">1回量(恵命我神散)</th> <th style="text-align: center;">1回量(恵命我神散S、 恵命我神散S〈細粒〉)</th> <th style="text-align: center;">服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">成人(15歳以上)</td> <td style="text-align: center;">3g</td> <td style="text-align: center;">1包</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">1日4回食後及び就寝前に服用する。 1日5~6回服用しても差し支えないが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用する。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11歳以上15歳未満</td> <td style="text-align: center;">2g</td> <td style="text-align: center;">2/3包</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7歳以上11歳未満</td> <td style="text-align: center;">1.5g</td> <td style="text-align: center;">1/2包</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3歳以上7歳未満</td> <td style="text-align: center;">1g</td> <td style="text-align: center;">1/3包</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3歳未満</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table> <p>1)定められた用法・用量を厳守してください。 2)小児に服用させる場合、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p>			年齢区分	1回量(恵命我神散)	1回量(恵命我神散S、 恵命我神散S〈細粒〉)	服用回数	成人(15歳以上)	3g	1包	1日4回食後及び就寝前に服用する。 1日5~6回服用しても差し支えないが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用する。	11歳以上15歳未満	2g	2/3包	7歳以上11歳未満	1.5g	1/2包	3歳以上7歳未満	1g	1/3包	3歳未満	服用しないこと		
年齢区分	1回量(恵命我神散)	1回量(恵命我神散S、 恵命我神散S〈細粒〉)	服用回数																						
成人(15歳以上)	3g	1包	1日4回食後及び就寝前に服用する。 1日5~6回服用しても差し支えないが、この場合には約4時間の間隔をおいて服用する。																						
11歳以上15歳未満	2g	2/3包																							
7歳以上11歳未満	1.5g	1/2包																							
3歳以上7歳未満	1g	1/3包																							
3歳未満	服用しないこと																								
4	効能・効果	食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐																							
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないでください。 ・本剤又は、本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。</p> <p>2. 次に該当する人はご相談ください。 1) 医師の治療を受けている人 2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 3) 次の診断を受けた人 : 肝臓病 4) 1か月ぐらい服用しても症状がよくなる場合</p>																							
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																								

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。