

2016-8
*2016年8月（住址變更）
*2014年4月（因記載方式更改而改訂）

使用前請務必閱讀本說明書。並保管好，以便需要時查閱。

腸胃藥  惠命我神散 S <微粒>

第2類醫藥品

惠命我神散 S <微粒> 是使用可使胃的運作活躍、具有促進膽汁分泌及脂肪消化和修復胃黏膜作用的蓬莪朮粉末、以及保護消化道黏膜功效的巨藻粉末，再添加苦味辛味和芳香的鬱金及生薑粉末配製成的生藥製劑。本腸胃藥尤其對胃腸虛弱、有胃脹感的症狀有效。



< 使用時的注意事項 >

禁用事項



（不能遵守以下事宜，會使目前症狀惡化，或易產生副作用。）
・以下情況者不可服用。對本品或本品成份有過敏史（出疹、發紅、發癢、浮腫等）。

徵求諮詢



- 以下情況者服用前，應向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。
 - 接受醫師治療者。
 - 對藥品等有過敏史者。
 - 診斷為肝臟病者。
- 服用後，出現以下症狀者，可能為副作用所致，應立即停止服用並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢、紅腫
消化器官	腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉

偶有出現以下嚴重症狀者，應當即接受醫師診療。

症狀名稱	症狀
休克（過敏性休克）	服用後即刻出現皮膚瘙癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、嘔吐、喉癢、窒悶感、心悸、意識模糊等。
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、出疹、黃疸（皮膚或白眼（鞏膜）發黃）、棕褐色尿、渾身乏力感、食慾不振等。

- 服用約1個月，症狀仍無改善者，應停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢。

其他注意事項

・慢性胃腸疾病患者如服用惠命我神散 S <微粒>，因腸胃功能增強，一時會感覺到腹部脹滿或胃鳴腸鳴等異常現象，約經一週可緩解。

功能・主治

食慾不振（食慾減退）、胃部・腹部脹滿感、消化不良、胃腸虛弱、過食、過飲、燒心、脹滿（胃脹）、胸悶、噁心（不適、胃不適、宿醉・醉後難受、反胃、噁心）、嘔吐

用法・用量 請按以下用量用涼水或熱水送服。

年齡區分	一次用量	服用次數
15歲以上	1包	1日4次，餐後或就寢前服用。 也可1日服用5-6次，每次須間隔4小時。
11歲以上15歲未滿	2/3包	
7歲以上11歲未滿	1/2包	
3歲以上7歲未滿	1/3包	不可服用
3歲未滿		

< 關於用法和用量的注意事項 >

- 務必嚴守規定的用法和用量。
- 兒童服用時，應在監護人指導監督下服用。

成份及含量 1包（3g）當中

成份	含量	功效
蓬莪朮粉末	2500mg	由薑科莪朮的根莖製成的生藥。味苦有清涼感。增強胃功能幫助消化。增進胃黏膜血流，改善胃黏膜病。有助膽汁分泌促進脂肪消化。
巨藻粉末	100mg	由巨藻科巨藻的藻體製成的生藥。可保護胃黏膜幫助腸胃恢復功能。

添加物含鬱金粉末、生薑粉末、部分預膠凝澱粉和。

< 關於成份的注意事項 >

- 本製劑因使用生藥製成，製品的顏色、味道和氣味等多少會有差異，但不影響療效。
- 因多含精油成份，偶有細粉凝聚情況，不影響品質。

貯藏注意事項

- 保管于兒童無法觸及之處。
- 避開直射日光，置陰涼乾燥處密封保存。
- 一包分次服用時，將剩餘部分的袋口反折封閉，務必在兩日之內服用。
- 服用時注意鋁箔紙勿切手或割嘴。

☆ 腸胃是健康之源。服用本製劑的同時，需在日常生活中注意以下事宜。



需注意飲食平衡，
不因放縱而偏食。



感到精神壓力立即調劑心情。
勿請保持心情舒暢的生活。



健康的身體體現為輕快的動作。
勿請適度運動。



緩慢、深沉、有力。
勿請運用正確的呼吸法提高心肺機能。

查詢服務

有關本製品的信息，請向求購處商店或以下地址查詢。

經銷商 株式會社 惠命堂
郵政編碼 104-0032
東京都中央區八丁堀2-24-2
網址 <http://www.keimeido.co.jp>

生產廠家 株式會社 老舖惠命堂
郵政編碼 104-0032
東京都中央區八丁堀2-24-2